楕円関数論しよーとこーす (1) Jacobi の楕円関数

緒方 秀教

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻

2021 年 3 月 18 日 (木)

この動画の目的

動画シリーズ「楕円関数論」の要約.

この動画では…

Jacobi 楕円関数論を一本の動画に要約

本動画の内容

Jacobi 楕円関数論

- ① 単振り子の振動-Jacobi 楕円関数の定義（実関数として）.
- ② 加法定理.
- ③ 複素関数としての Jacobi 楕円関数. 二重周期性.

* 「2. 加法定理」, 「3. 複素関数としての Jacobi 楕円関数. 二重周期性」の諸定理の証明（全部「補遺」に記した）は、以前よりかなり書き直しています.

(1/3) 単振り子の振動-Jacobi 楕円関数の定義

単振り子

質量 m , 糸の長さ l , 振れの角度 θ

($\theta_{\max}$: θ の最大値, $t = 0$ で $\theta = 0$)

運動方程式

$$ml \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg \sin \theta,$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \quad \left(\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \right).$$

両辺に $d\theta/dt$ を掛けて積分する:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 - \omega_0^2 \cos \theta = -\omega_0^2 \cos \theta_{\max} \quad \text{エネルギー保存則,}$$

$$\frac{1}{4\omega_0^2} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = \sin^2 \frac{\theta_{\max}}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

(1/3) 単振り子の振動-Jacobi 楕円関数の定義

$$\frac{1}{4\omega_0^2} \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = k^2 - \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad k = \sin \frac{\theta_{\max}}{2} \quad (0 < k < 1).$$

$\sin \frac{\theta}{2} = k \sin \varphi$ とおくと,

$$\frac{1}{\omega_0^2} \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 = 1 - k^2 \sin^2 \varphi,$$

$$\int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} = \omega_0 t$$

$x = \sin \varphi$ とおくと,

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \omega_0 t.$$

(1/3) 単振り子の振動-Jacobi 楕円関数 : sn 関数

Jacobi の楕円関数 sn u

$$x = \operatorname{sn} u = \operatorname{sn}(u; k) \stackrel{\text{def}}{\iff} u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}},$$

$k (0 < k < 1)$ 母数.

$$K = K(k)$$

$$:= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$$

第 1 種完全楕円積分.

$\operatorname{sn} u$ は $0 \leq u \leq K$ で単調増加, $\operatorname{sn} 0 = 0$, $\operatorname{sn} K = 1$.

(1/3) 単振り子の振動：単振り子の運動方程式の解

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \omega_0 t \quad \text{より} \quad x = \text{sn}(\omega_0 t; k).$$

$x = \sin \varphi$, $\sin(\theta/2) = k \sin \varphi$ であったから,

単振り子の運動方程式の解

$$\theta(t) = 2 \arcsin [k \text{sn}(\omega_0 t; k)] \quad \left(k = \sin \frac{\theta_{\max}}{2}, \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \right).$$

(1/3) 単振り子の振動：単振り子の運動方程式の解

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} = \omega_0 t \quad \text{より} \quad x = \text{sn}(\omega_0 t; k).$$

$x = \sin \varphi$, $\sin(\theta/2) = k \sin \varphi$ であったから,

単振り子の運動方程式の解

$$\theta(t) = 2 \arcsin [k \text{sn}(\omega_0 t; k)] \quad \left(k = \sin \frac{\theta_{\max}}{2}, \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \right).$$

とくに振れの角が小さい ($\theta_{\max} \approx 0$) 場合,

$$\omega_0 t \approx \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x, \quad x = \sin \varphi \approx \varphi \quad \text{より} \quad \varphi \approx \sin \omega_0 t,$$

$$\frac{\theta}{2} \approx \sin \frac{\theta}{2} = k \sin \varphi \approx k\varphi, \quad k = \sin \frac{\theta_{\max}}{2} \approx \frac{\theta_{\max}}{2}.$$

$$\therefore \theta(t) \approx \theta_{\max} \sin \omega_0 t \quad \text{単振動.}$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：極限 $k \rightarrow 0, 1$

なぜ「逆関数」を考えるのか？

$$x = \operatorname{sn}(u; k) \quad \Leftrightarrow \quad u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：極限 $k \rightarrow 0, 1$

なぜ「逆関数」を考えるのか？

$$x = \operatorname{sn}(u; k) \quad \Leftrightarrow \quad u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

- 極限 $k \rightarrow 0$.

$$u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x, \quad \therefore \operatorname{sn}(u; 0) = \sin u.$$

- 極限 $k \rightarrow 1$.

$$u = \int_0^x \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \quad \therefore \operatorname{sn}(u; 1) = \tanh u.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：極限 $k \rightarrow 0, 1$

なぜ「逆関数」を考えるのか？

$$x = \operatorname{sn}(u; k) \quad \Leftrightarrow \quad u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

- 極限 $k \rightarrow 0$.

$$u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x, \quad \therefore \operatorname{sn}(u; 0) = \sin u.$$

- 極限 $k \rightarrow 1$.

$$u = \int_0^x \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \quad \therefore \operatorname{sn}(u; 1) = \tanh u.$$

* 「楕円関数」の名前の由来

- 第1種楕円積分 $u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$ の逆関数である。
- 楕円の周長：第2種楕円積分で表される。

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : cn, dn 関数

cn, dn 関数 ($0 \leq u \leq K$)

$$\operatorname{cn} u = \operatorname{cn}(u; k) := \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u},$$

$$\operatorname{dn} u = \operatorname{dn}(u; k) := \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u}.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : cn, dn 関数

cn, dn 関数 ($0 \leq u \leq K$)

$$\operatorname{cn} u = \operatorname{cn}(u; k) := \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u},$$

$$\operatorname{dn} u = \operatorname{dn}(u; k) := \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u}.$$

$$\operatorname{cn}(0; k) = \operatorname{dn}(0; k) = 1,$$

$$\operatorname{cn}(K; k) = 0, \quad \operatorname{dn}(K; k) = k'$$

$$(k' = \sqrt{1 - k^2} \text{ 補母数}).$$

極限 : $k \rightarrow 0, 1$.

$$\operatorname{sn}(u; 0) = \sin u, \quad \operatorname{sn}(u; 1) = \tanh u$$

⇓

$$\operatorname{cn}(u; 0) = \cos u, \quad \operatorname{cn}(u; 1) = \operatorname{sech} u.$$

$$\operatorname{dn}(u; 0) = 1, \quad \operatorname{dn}(u; 1) = \operatorname{sech} u.$$

$\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u, \operatorname{dn} u$ ($k = \sqrt{0.5}$).

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：振幅関数 am

$$x = \operatorname{sn} u = \operatorname{sn}(u; k) \iff u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}},$$

変数変換 $x = \sin \psi$ を行う.

振幅関数 am

$$\psi = \operatorname{am} u = \operatorname{am}(u; k) \stackrel{\text{def.}}{\iff} u = \int_0^\psi \frac{d\psi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \psi}}.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：振幅関数 am

$$x = \operatorname{sn} u = \operatorname{sn}(u; k) \iff u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}},$$

変数変換 $x = \sin \psi$ を行う。

振幅関数 am

$$\psi = \operatorname{am} u = \operatorname{am}(u; k) \stackrel{\text{def.}}{\iff} u = \int_0^\psi \frac{d\psi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \psi}}.$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} u &= \sin \psi = \sin(\operatorname{am} u), \\ \operatorname{cn} u &= \cos \psi = \cos(\operatorname{am} u). \end{aligned}$$

縦軸： $\operatorname{am} u / \pi$

横軸： u/K

$$k = \sqrt{0.5}.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $u \leq 0$ への拡張

$\operatorname{sn}, \operatorname{cn}, \operatorname{dn}$ の定義域を $-K \leq u \leq 0$ に拡張する.

$x = \operatorname{sn} u$ とすると,

$$-u = \int_0^{-x} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

↓

$$\operatorname{sn}(-u) = -\operatorname{sn} u \quad \text{奇関数.}$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $u \leq 0$ への拡張

sn, cn, dn の定義域を $-K \leq u \leq 0$ に拡張する.

$x = \text{sn } u$ とすると,

$$-u = \int_0^{-x} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

↓

$\text{sn}(-u) = -\text{sn } u$ 奇関数.

$$\text{cn } u = \sqrt{1 - \text{sn}^2 u},$$

$$\text{dn } u = \sqrt{1 - k^2 \text{sn}^2 u}$$

↓

$\text{cn}(-u) = \text{cn } u$

$\text{dn}(-u) = \text{dn } u$

偶関数.

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $-\infty < u < +\infty$ への拡張

sn, cn, dn の定義域を全実数 ($-\infty < u < +\infty$) に拡張する.
そこで, sn, cn, dn が周期関数であることをこれから示す.

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $-\infty < u < +\infty$ への拡張

sn, cn, dn の定義域を全実数 ($-\infty < u < +\infty$) に拡張する.
そこで, **sn, cn, dn が周期関数である** ことをこれから示す.

$\psi = \text{am}(u; k)$ とおく ($\text{sn } u = \sin \psi$, $\text{cn } u = \cos \psi$).

$$\begin{aligned} u + 2K &= \int_0^\psi \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} \\ &= \left(\int_0^\psi + \int_\psi^{\psi+\pi} \right) \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} = \int_0^{\psi+\pi} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}}, \end{aligned}$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $-\infty < u < +\infty$ への拡張

sn, cn, dn の定義域を全実数 ($-\infty < u < +\infty$) に拡張する.
そこで, **sn, cn, dn が周期関数である** ことをこれから示す.

$\psi = \text{am}(u; k)$ とおく ($\text{sn } u = \sin \psi$, $\text{cn } u = \cos \psi$).

$$\begin{aligned} u + 2K &= \int_0^\psi \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} \\ &= \left(\int_0^\psi + \int_\psi^{\psi+\pi} \right) \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} = \int_0^{\psi+\pi} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}}, \end{aligned}$$

振幅関数 am の定義から,

$$\begin{aligned} \psi + \pi &= \text{am } u + \pi = \text{am}(u + 2K), \\ \text{sn}(u + 2K) &= \sin(\psi + \pi) = -\sin \psi = -\text{sn } u, \\ \text{cn}(u + 2K) &= \cos(\psi + \pi) = -\cos \psi = -\text{cn } u, \\ \text{dn}(u + 2K) &= \sqrt{1 - k^2 \text{sn}^2(u + 2K)} = \text{dn } u. \end{aligned}$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $-\infty < u < +\infty$ への拡張

sn, cn, dn の定義域を全実数 ($-\infty < u < +\infty$) に拡張する.
そこで, **sn, cn, dn が周期関数である** ことをこれから示す.

$\psi = \text{am}(u; k)$ とおく ($\text{sn } u = \sin \psi$, $\text{cn } u = \cos \psi$).

$$\begin{aligned} u + 2K &= \int_0^\psi \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} \\ &= \left(\int_0^\psi + \int_\psi^{\psi+\pi} \right) \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} = \int_0^{\psi+\pi} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}}, \end{aligned}$$

振幅関数 am の定義から,

$$\begin{aligned} \psi + \pi &= \text{am } u + \pi = \text{am}(u + 2K), \\ \text{sn}(u + 2K) &= \sin(\psi + \pi) = -\sin \psi = -\text{sn } u, \\ \text{cn}(u + 2K) &= \cos(\psi + \pi) = -\cos \psi = -\text{cn } u, \\ \text{dn}(u + 2K) &= \sqrt{1 - k^2 \text{sn}^2(u + 2K)} = \text{dn } u. \end{aligned}$$

$$\text{sn}(u + 2K) = -\text{sn } u, \quad \text{cn}(u + 2K) = -\text{cn } u, \quad \text{dn}(u + 2K) = \text{dn } u.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $-\infty < u < +\infty$ への拡張

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u + 2K) &= -\operatorname{sn} u, & \operatorname{cn}(u + 2K) &= -\operatorname{cn} u, & \operatorname{dn}(u + 2K) &= \operatorname{dn} u, \\ \operatorname{sn}(u + 4K) &= \operatorname{sn} u, & \operatorname{cn}(u + 4K) &= \operatorname{cn} u. \end{aligned}$$

$\operatorname{sn} u, \operatorname{cn} u$ は周期 $4K$ の, $\operatorname{dn} u$ は周期 $2K$ の周期関数である。

- $\operatorname{sn} u$ の零点 :
 $2nK \quad (n \in \mathbb{Z})$.
- $\operatorname{cn} u$ の零点 :
 $(2n + 1)K \quad (n \in \mathbb{Z})$.
- $\operatorname{dn} u$ は実関数としては
零点を持たない。

$\operatorname{sn}, \operatorname{cn}, \operatorname{dn} \quad (k = \sqrt{0.5})$ のグラフ。

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：単振り子運動の解

単振り子の運動方程式の解

$$\theta(t) = 2 \arcsin [k \operatorname{sn}(\omega_0 t; k)] \quad \left(k = \sin \frac{\theta_{\max}}{2}, \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \right).$$

解 $\theta(t)$ のグラフ ($\theta_{\max} = \pi/2$).

縦軸： $\theta(t)/\pi$

横軸： $\omega_0 t/K$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：単振り子の周期

単振り子の周期 T を求める。

$$\theta(t) = 2 \arcsin [k \operatorname{sn}(\omega_0 t; k)] \quad \left(k = \sin \frac{\theta_{\max}}{2}, \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \right),$$

$\operatorname{sn}(u; k)$ の周期は $4K$ であるから、

単振り子の周期

$$T = \frac{4K}{\omega_0} = 4K \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad K = \int_0^{\pi/2} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} \quad \left(\begin{array}{c} \text{第一種} \\ \text{完全楕円積分} \end{array} \right).$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：単振り子の周期

単振り子の周期 T を求める。

$$\theta(t) = 2 \arcsin [k \operatorname{sn}(\omega_0 t; k)] \quad \left(k = \sin \frac{\theta_{\max}}{2}, \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \right),$$

$\operatorname{sn}(u; k)$ の周期は $4K$ であるから、

単振り子の周期

$$T = \frac{4K}{\omega_0} = 4K \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad K = \int_0^{\pi/2} \frac{d\psi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \psi}} \quad \left(\begin{array}{c} \text{第一種} \\ \text{完全楕円積分} \end{array} \right).$$

振れの角が小さい場合、 $k \approx 0$, $K \approx \pi/2$ であるから、

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：微分方程式

sn, cn, dn の満たす微分方程式

$$\frac{d}{du} \operatorname{sn} u = \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u,$$

$$\frac{d}{du} \operatorname{cn} u = -\operatorname{sn} u \operatorname{dn} u,$$

$$\frac{d}{du} \operatorname{dn} u = -k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：微分方程式

sn, cn, dn の満たす微分方程式

$$\frac{d}{du} \operatorname{sn} u = \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u,$$

$$\frac{d}{du} \operatorname{cn} u = -\operatorname{sn} u \operatorname{dn} u,$$

$$\frac{d}{du} \operatorname{dn} u = -k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u.$$

(証明) $x = \operatorname{sn} u$ とおく.

$$u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}, \quad \frac{du}{dx} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}},$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{du} &= \sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)} \\ &= \sqrt{1-\operatorname{sn}^2 u} \sqrt{1-k^2 \operatorname{sn}^2 u} \\ &= \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u, \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{du} \operatorname{sn} u = \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u.$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義：微分方程式

$$\begin{aligned}\frac{d}{du} \operatorname{cn} u &= \frac{d}{du} \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u} = -\frac{\operatorname{sn} u (\operatorname{sn} u)'}{\sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u}} \\ &= -\frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{\operatorname{cn} u} = -\operatorname{sn} u \operatorname{dn} u, \\ \therefore \frac{d}{du} \operatorname{cn} u &= -\operatorname{sn} u \operatorname{dn} u.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{du} \operatorname{dn} u &= \frac{d}{du} \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u} = -\frac{k^2 \operatorname{sn} u (\operatorname{sn} u)'}{\sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u}} \\ &= -\frac{k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{\operatorname{dn} u} = -k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u, \\ \therefore \frac{d}{du} \operatorname{dn} u &= -k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u.\end{aligned}$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱い

$\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱いについて.

$\sqrt{\cdot}$ は (複素関数論的には) 二価関数ではないか?

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱い

$\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱いについて.

$\sqrt{\cdot}$ は (複素関数論的には) 二価関数ではないか?

$\varphi(u) = 1 - \text{sn}^2 u$ の $u = K$ における Taylor 級数展開を求めてみると,

$$\frac{dx}{du} = \sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)} \quad (x = \text{sn } u)$$

を用いて,

$$\varphi(K) = 0, \quad \varphi'(K) = -2 \text{sn } u \sqrt{(1 - \text{sn}^2 u)(1 - k^2 \text{sn}^2 u)} \Big|_{u=K} = 0,$$

$$\varphi''(K) = 2 \text{sn}^2 u (1 - k^2 \text{sn}^2 u) \Big|_{u=K} = 2k'^2, \quad \dots$$

$$\varphi(u) = 1 - \text{sn}^2 u = k'^2(u - K)^2 + c_2(u - K)^4 + \dots \quad (c_2, \dots : \text{const.}),$$

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - \text{sn}^2 u} &= \sqrt{k'^2(u - K)^2 + c_2(u - K)^4 + \dots} \\ &= \pm k'(u - K) \sqrt{1 + \frac{c_2}{k'^2}(u - K)^2 + \dots}. \end{aligned}$$

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱い

$\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱いについて.

$\sqrt{\cdot}$ は (複素関数論的には) 二価関数ではないか?

$\varphi(u) = 1 - \text{sn}^2 u$ の $u = K$ における Taylor 級数展開を求めてみると,

$$\frac{dx}{du} = \sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)} \quad (x = \text{sn } u)$$

を用いて,

$$\varphi(K) = 0, \quad \varphi'(K) = -2 \text{sn } u \sqrt{(1 - \text{sn}^2 u)(1 - k^2 \text{sn}^2 u)} \Big|_{u=K} = 0,$$

$$\varphi''(K) = 2 \text{sn}^2 u (1 - k^2 \text{sn}^2 u) \Big|_{u=K} = 2k'^2, \quad \dots$$

$$\varphi(u) = 1 - \text{sn}^2 u = k'^2(u - K)^2 + c_2(u - K)^4 + \dots \quad (c_2, \dots : \text{const.}),$$

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - \text{sn}^2 u} &= \sqrt{k'^2(u - K)^2 + c_2(u - K)^4 + \dots} \\ &= \pm k'(u - K) \sqrt{1 + \frac{c_2}{k'^2}(u - K)^2 + \dots}. \end{aligned}$$

$\sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ は 2 個の一価関数を表している.

$u = -K, \pm 3K, \pm 5K, \dots$ でも同様.

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱い

$\sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ は 2 個の一価関数.

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱い

$\sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ は 2 個の一価関数.

$\sqrt{1 - \text{sn}^2 u} (=:\text{cn } u)$ は「2 個の一価関数」のうち、 $u=0$ で 1 の値をとるものと約束する.

$\text{dn } u := \sqrt{1 - k^2 \text{sn}^2 u}$ も同様に定義する.

(1/3) Jacobi 楕円関数の定義 : $\text{cn } u := \sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ の扱い

$\sqrt{1 - \text{sn}^2 u}$ は 2 個の一価関数.

$\sqrt{1 - \text{sn}^2 u}(=:\text{cn } u)$ は「2 個の一価関数」のうち、 $u=0$ で 1 の値をとるものと約束する.

$\text{dn } u := \sqrt{1 - k^2 \text{sn}^2 u}$ も同様に定義する.

* あるいは振幅関数 $\psi = \text{am } u$ を使って議論する.

$$\text{sn } u = \sin \psi, \quad \text{cn } u = \cos \psi.$$

(2/3) 加法定理

Jacobi 楕円関数の加法定理

$$\operatorname{sn}(u + v; k) = ?, \quad \operatorname{cn}(u + v; k) = ?, \quad \operatorname{dn}(u + v; k) = ?.$$

(2/3) 加法定理

Jacobi 楕円関数の加法定理

$$\operatorname{sn}(u+v; k) = ?, \quad \operatorname{cn}(u+v; k) = ?, \quad \operatorname{dn}(u+v; k) = ?.$$

$k \rightarrow 0, 1$ の場合から推測してみる.

Jacobi 楕円関数の $k \rightarrow 0, 1$ における極限.

$$(k \rightarrow 0) \quad \operatorname{sn}(u; 0) = \sin u, \quad \operatorname{cn}(u; 0) = \cos u, \quad \operatorname{dn}(u; 0) = 1,$$

$$(k \rightarrow 1) \quad \operatorname{sn}(u; 1) = \tanh u, \quad \operatorname{cn}(u; 1) = \operatorname{dn}(u; 1) = \operatorname{sech} u.$$

極限 $k \rightarrow 0, 1$ における加法定理.

$$\begin{aligned} \sin(u+v) &= \sin u \cos v + \cos u \sin v, \\ \tanh(u+v) &= \frac{\tanh u \operatorname{sech}^2 v + \tanh v \operatorname{sech}^2 u}{1 - \tanh^2 u \tanh^2 v}. \end{aligned}$$

これらを $\operatorname{sn}, \operatorname{cn}, \operatorname{dn}$ で書き直す.

(2/3) 加法定理

$$\begin{aligned}\operatorname{sn}(u+v; 0) &= \operatorname{sn}(u; 0) \operatorname{cn}(v; 0) \operatorname{dn}(v; 0) + \operatorname{sn}(v; 0) \operatorname{cn}(u; 0) \operatorname{dn}(u; 0), \\ \operatorname{sn}(u+v; 1) &= \frac{\operatorname{sn}(u; 1) \operatorname{cn}(v; 1) \operatorname{dn}(v; 1) + \operatorname{sn}(v; 1) \operatorname{cn}(u; 1) \operatorname{dn}(u; 1)}{1 - \operatorname{sn}^2(u; 1) \operatorname{sn}^2(v; 1)}.\end{aligned}$$

(2/3) 加法定理

$$\operatorname{sn}(u+v; 0) = \operatorname{sn}(u; 0) \operatorname{cn}(v; 0) \operatorname{dn}(v; 0) + \operatorname{sn}(v; 0) \operatorname{cn}(u; 0) \operatorname{dn}(u; 0),$$

$$\operatorname{sn}(u+v; 1) = \frac{\operatorname{sn}(u; 1) \operatorname{cn}(v; 1) \operatorname{dn}(v; 1) + \operatorname{sn}(v; 1) \operatorname{cn}(u; 1) \operatorname{dn}(u; 1)}{1 - \operatorname{sn}^2(u; 1) \operatorname{sn}^2(v; 1)}.$$

これらを $0 < k < 1$ で補間する式として、次の加法定理が予想される。

$$\operatorname{sn}(u+v; k) = \frac{\operatorname{sn}(u; k) \operatorname{cn}(v; k) \operatorname{dn}(v; k) + \operatorname{sn}(v; k) \operatorname{cn}(u; k) \operatorname{dn}(u; k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u; k) \operatorname{sn}^2(v; k)}.$$

(2/3) 加法定理

$$\operatorname{sn}(u+v; 0) = \operatorname{sn}(u; 0) \operatorname{cn}(v; 0) \operatorname{dn}(v; 0) + \operatorname{sn}(v; 0) \operatorname{cn}(u; 0) \operatorname{dn}(u; 0),$$

$$\operatorname{sn}(u+v; 1) = \frac{\operatorname{sn}(u; 1) \operatorname{cn}(v; 1) \operatorname{dn}(v; 1) + \operatorname{sn}(v; 1) \operatorname{cn}(u; 1) \operatorname{dn}(u; 1)}{1 - \operatorname{sn}^2(u; 1) \operatorname{sn}^2(v; 1)}.$$

これらを $0 < k < 1$ で補間する式として、次の加法定理が予想される。

$$\operatorname{sn}(u+v; k) = \frac{\operatorname{sn}(u; k) \operatorname{cn}(v; k) \operatorname{dn}(v; k) + \operatorname{sn}(v; k) \operatorname{cn}(u; k) \operatorname{dn}(u; k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u; k) \operatorname{sn}^2(v; k)}.$$

$\operatorname{cn} u = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u}$, $\operatorname{dn} u = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u}$ より次を得る（「補遺 1」参照）。

$$\operatorname{cn}(u+v; k) = \frac{\operatorname{cn}(u; k) \operatorname{cn}(v; k) - \operatorname{sn}(u; k) \operatorname{dn}(u; k) \operatorname{sn}(v; k) \operatorname{dn}(v; k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u; k) \operatorname{sn}^2(v; k)},$$

$$\operatorname{dn}(u+v; k) = \frac{\operatorname{dn}(u; k) \operatorname{dn}(v; k) - k^2 \operatorname{sn}(u; k) \operatorname{cn}(u; k) \operatorname{sn}(v; k) \operatorname{cn}(v; k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u; k) \operatorname{sn}^2(v; k)}.$$

そして、これらの等式は実際に正しいことが示される。

(2/3) 加法定理

Jacobi 楕円関数の加法定理

$$\operatorname{sn}(u+v) = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v},$$

$$\operatorname{cn}(u+v) = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{dn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} v}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v},$$

$$\operatorname{dn}(u+v) = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}.$$

- 加法定理のちゃんとした証明は、本 PC スライド末尾の「補遺 2」に記します。
- 本 PC スライドは Web にアップロードしておきます。概要欄に URL <http://www.uec-ogata-lab.jp/research/> を記しますのでそれをクリックしてください。

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

Jacobi 楕円関数を複素関数に拡張する.

はじめに, 純虚数を引数にもつ楕円関数を求める.

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

Jacobi 楕円関数を複素関数に拡張する.

はじめに, 純虚数を引数にもつ楕円関数を求める.

$$x = \operatorname{sn}(iv; k) \iff iv = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

Jacobi 楕円関数を複素関数に拡張する.

はじめに, 純虚数を引数にもつ楕円関数を求める.

$$x = \operatorname{sn}(iv; k) \iff iv = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

$x = iy$ とおくと,

$$v = \int_0^y \frac{dy}{\sqrt{(1+y^2)(1+k^2y^2)}}.$$

$y = \tan \psi$ とおくと,

$$v = \int_0^\psi \frac{d\psi}{\sqrt{1-k'^2 \sin^2 \psi}}, \quad k' = \sqrt{1-k^2} \quad (\text{補母数}),$$

$$\therefore \psi = \operatorname{am}(v; k'), \quad \sin \psi = \operatorname{sn}(v; k'), \quad \cos \psi = \operatorname{cn}(v; k').$$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

$$y = \tan \psi = \frac{\sin \psi}{\cos \psi} = \frac{\operatorname{sn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')}.$$

$x = iy = \operatorname{sn}(iv; k)$ であったから,

$$\operatorname{sn}(iv; k) = i \frac{\operatorname{sn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')}.$$

$\operatorname{cn} u = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u}$, $\operatorname{dn} u = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u}$ より,

$$\operatorname{cn}(iv; k) = \frac{1}{\operatorname{cn}(v; k')}, \quad \operatorname{dn}(iv; k) = \frac{\operatorname{dn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')}.$$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

$$y = \tan \psi = \frac{\sin \psi}{\cos \psi} = \frac{\operatorname{sn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')}.$$

$x = iy = \operatorname{sn}(iv; k)$ であったから,

$$\operatorname{sn}(iv; k) = i \frac{\operatorname{sn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')}.$$

$\operatorname{cn} u = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u}$, $\operatorname{dn} u = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u}$ より,

$$\operatorname{cn}(iv; k) = \frac{1}{\operatorname{cn}(v; k')}, \quad \operatorname{dn}(iv; k) = \frac{\operatorname{dn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')}.$$

純虚数を引数にもつ Jacobi 楕円関数

$$\operatorname{sn}(iv; k) = i \frac{\operatorname{sn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')}, \quad \operatorname{cn}(iv; k) = \frac{1}{\operatorname{cn}(v; k')}, \quad \operatorname{dn}(iv; k) = \frac{\operatorname{dn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')}.$$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

複素変数の Jacobi 楕円関数.

加法定理の式 $\operatorname{sn}(u + v; k) = \dots$ で形式的に $v \rightarrow iv$ とする.

$$\begin{aligned} & \operatorname{sn}(u + iv; k) \\ = & \frac{\operatorname{sn}(u; k)\operatorname{cn}(iv; k)\operatorname{dn}(iv; k) + \operatorname{sn}(iv; k)\operatorname{cn}(u; k)\operatorname{dn}(u; k)}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u; k)\operatorname{sn}^2(iv; k)} \\ = & \frac{\operatorname{sn}(u; k) \frac{1}{\operatorname{cn}(v; k')} \frac{\operatorname{dn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')} + i \frac{\operatorname{sn}(v; k')}{\operatorname{cn}(v; k')} \operatorname{cn}(u; k)\operatorname{dn}(u; k)}{1 + k^2 \operatorname{sn}^2(u; k) \frac{\operatorname{sn}^2(v; k')}{\operatorname{cn}^2(v; k')}} \\ = & \frac{\operatorname{sn}(u; k)\operatorname{dn}(v; k') + i \operatorname{cn}(u; k)\operatorname{dn}(u; k)\operatorname{sn}(v; k')\operatorname{cn}(v; k')}{\operatorname{cn}^2(v; k') + k^2 \operatorname{sn}^2(u; k)\operatorname{sn}^2(v; k')}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

複素関数としての sn , cn , dn

$$\text{sn}(u + iv; k) = \frac{\text{sn}(u; k) \text{dn}(v; k') + i \text{cn}(u; k) \text{dn}(u; k) \text{sn}(v; k') \text{cn}(v; k')}{\text{cn}^2(v; k') + k^2 \text{sn}^2(u; k) \text{sn}^2(v; k')},$$

$$\text{cn}(u + iv; k) = \frac{\text{cn}(u; k) \text{cn}(v; k') - i \text{sn}(u; k) \text{dn}(u; k) \text{sn}(v; k') \text{dn}(v; k')}{\text{cn}^2(v; k') + k^2 \text{sn}^2(u; k) \text{sn}^2(v; k')},$$

$$\text{dn}(u + iv; k) = \frac{\text{dn}(u; k) \text{cn}(v; k') \text{dn}(v; k') - ik^2 \text{sn}(u; k) \text{cn}(u; k) \text{sn}(v; k')}{\text{cn}^2(v; k') + k^2 \text{sn}^2(u; k) \text{sn}^2(v; k')}$$

($k' = \sqrt{1 - k^2}$ 補母数).

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

複素関数としての sn , cn , dn

$$\operatorname{sn}(u + iv; k) = \frac{\operatorname{sn}(u; k) \operatorname{dn}(v; k') + i \operatorname{cn}(u; k) \operatorname{dn}(u; k) \operatorname{sn}(v; k') \operatorname{cn}(v; k')}{\operatorname{cn}^2(v; k') + k^2 \operatorname{sn}^2(u; k) \operatorname{sn}^2(v; k')},$$

$$\operatorname{cn}(u + iv; k) = \frac{\operatorname{cn}(u; k) \operatorname{cn}(v; k') - i \operatorname{sn}(u; k) \operatorname{dn}(u; k) \operatorname{sn}(v; k') \operatorname{dn}(v; k')}{\operatorname{cn}^2(v; k') + k^2 \operatorname{sn}^2(u; k) \operatorname{sn}^2(v; k')},$$

$$\operatorname{dn}(u + iv; k) = \frac{\operatorname{dn}(u; k) \operatorname{cn}(v; k') \operatorname{dn}(v; k') - ik^2 \operatorname{sn}(u; k) \operatorname{cn}(u; k) \operatorname{sn}(v; k')}{\operatorname{cn}^2(v; k') + k^2 \operatorname{sn}^2(u; k) \operatorname{sn}^2(v; k')}$$

$$(k' = \sqrt{1 - k^2} \text{ 補母数}).$$

$\operatorname{sn} z, \operatorname{cn} z, \operatorname{dn} z$ ($z = u + iv$) は分母 = 0 となる点以外で
Cauchy-Riemann 関係式を満たすことが示される (「補遺 3」参照)。

$\therefore \operatorname{sn} z, \operatorname{cn} z, \operatorname{dn} z$ は分母 = 0 なる点以外で正則関数である。

$$\operatorname{sn}, \operatorname{cn}, \operatorname{dn} \text{ の特異点 (分母 = 0) : } u + iv = 2mK + (2n + 1)iK', \\ m, n \in \mathbb{Z}, \quad K' = K(k').$$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

$$\Sigma := \mathbb{C} - \{2mK + (2n+1)iK' \mid m, n \in \mathbb{Z}\},$$

$\mathbb{C}$ から $\text{sn}, \text{cn}, \text{dn}$ の特異点を除いた領域.

$\text{sn } z, \text{cn } z, \text{dn } z$ ($z = u + iv$) は Σ で正則関数であるから、複素関数論における一致の定理より、 $\text{sn}, \text{cn}, \text{dn}$ に対する微分方程式・加法定理等は複素関数に拡張してもそのまま成立する。

$$\frac{d}{dz} \text{sn } z = \text{cn } z \text{ dn } z, \quad \frac{d}{dz} \text{cn } z = -\text{sn } z \text{ dn } z, \quad \frac{d}{dz} \text{dn } z = -k^2 \text{sn } z \text{cn } z,$$

$$\text{sn}(z+w) = \frac{\text{sn } z \text{cn } w \text{dn } w + \text{sn } w \text{cn } z \text{dn } z}{1 - k^2 \text{sn}^2 z \text{sn}^2 w},$$

$$\text{cn}(z+w) = \frac{\text{cn } z \text{cn } w - \text{sn } z \text{dn } z \text{sn } w \text{dn } w}{1 - k^2 \text{sn}^2 z \text{sn}^2 w},$$

$$\text{dn}(z+w) = \frac{\text{dn } z \text{dn } w - k^2 \text{sn } z \text{cn } z \text{sn } w \text{cn } w}{1 - k^2 \text{sn}^2 z \text{sn}^2 w},$$

$$\text{sn}(iz; k) = i \frac{\text{sn}(z; k')}{\text{cn}(z; k')}, \quad \text{cn}(iz; k) = \frac{1}{\text{cn}(z; k')}, \quad \text{dn}(iz; k) = \frac{\text{dn}(z; k')}{\text{cn}(z; k')}.$$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

加法定理と複素変数に対する楕円関数の公式より

$$\begin{aligned}\operatorname{sn}(z + iK') &= \frac{1}{k \operatorname{sn} z}, & \operatorname{cn}(z + iK') &= -\frac{i}{k} \frac{\operatorname{dn} z}{\operatorname{sn} z}, & \operatorname{dn}(z + iK') &= -i \frac{\operatorname{cn} z}{\operatorname{sn} z}, \\ \operatorname{sn}(z + 2iK') &= \operatorname{sn} z, & \operatorname{cn}(z + 2iK') &= -\operatorname{cn} z, & \operatorname{dn}(z + 2iK') &= -\operatorname{dn} z, \\ \operatorname{cn}(z + 2K + 2iK') &= \operatorname{cn} z, & \operatorname{dn}(z + 4iK') &= \operatorname{dn} z.\end{aligned}$$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

加法定理と複素変数に対する楕円関数の公式より

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(z + iK') &= \frac{1}{k \operatorname{sn} z}, & \operatorname{cn}(z + iK') &= -\frac{i}{k} \frac{\operatorname{dn} z}{\operatorname{sn} z}, & \operatorname{dn}(z + iK') &= -i \frac{\operatorname{cn} z}{\operatorname{sn} z}, \\ \operatorname{sn}(z + 2iK') &= \operatorname{sn} z, & \operatorname{cn}(z + 2iK') &= -\operatorname{cn} z, & \operatorname{dn}(z + 2iK') &= -\operatorname{dn} z, \\ \operatorname{cn}(z + 2K + 2iK') &= \operatorname{cn} z, & \operatorname{dn}(z + 4iK') &= \operatorname{dn} z. \end{aligned}$$

Jacobi 楕円関数は二重周期関数である

	sn	cn	dn
周期	$4K, 2iK'$	$4K, 2K + 2iK'$	$2K, 4iK'$

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

Jacobi 楕円関数の零点・極

- 零点・極 (すべて 1 位の零点・極, $m, n \in \mathbb{Z}$)

	零点	極
sn	$2mK + 2niK'$	$2mK + (2n + 1)iK'$
cn	$(2m + 1)K + 2niK'$	$2mK + (2n + 1)iK'$
dn	$(2m + 1)K + (2n + 1)iK'$	$2mK + (2n + 1)iK'$

上記の零点・極がすべて 1 位であることは「補遺 4」参照。

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

Jacobi 楕円関数の零点・極

- 零点・極 (すべて 1 位の零点・極, $m, n \in \mathbb{Z}$)

	零点	極
sn	$2mK + 2niK'$	$2mK + (2n + 1)iK'$
cn	$(2m + 1)K + 2niK'$	$2mK + (2n + 1)iK'$
dn	$(2m + 1)K + (2n + 1)iK'$	$2mK + (2n + 1)iK'$

上記の零点・極がすべて 1 位であることは「補遺 4」参照.

- Jacobi 楕円関数は全複素平面 $\mathbb{C}$ 上の有理型関数 (特異点はすべて極である関数) である.
- Jacobi 楕円関数は二重周期関数である.

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

$\operatorname{sn} u$ の二重周期性.

$|\operatorname{sn}(u; k)|$ の三次元グラフ ($k = \sqrt{0.5}$).

(3/3) 複素関数としての Jacobi 楕円関数

sn

cn

dn

Jacobi 楕円関数の周期平行四辺形.

Jacobi 楕円関数 sn , cn , dn .

- (例題) 単振り子の振動.
- Jacobi 楕円関数 sn , cn , dn の定義.

$$x = \operatorname{sn} u = \operatorname{sn}(u; k) \stackrel{\text{def}}{\iff} u = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}},$$

$$\operatorname{cn} u = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u}, \quad \operatorname{dn} u = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u},$$

k ($0 < k < 1$): 母数.

- 加法定理.
- 複素関数への拡張.
- Jacobi 楕円関数は二重周期性をもつ, 全複素平面 $\mathbb{C}$ 上の有理型関数である.

補遺 1 : (2/3)cn, dn の加法定理

sn の加法定理

$$\operatorname{sn}(u+v) = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}$$

から cn の加法定理を得るには, 次のように計算する.

$$\operatorname{cn}^2(u+v) = 1 - \operatorname{sn}^2(u+v) = 1 - \left(\frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{\Delta} \right)^2,$$
$$\Delta = 1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v.$$

ここで,

$$\Delta = \operatorname{cn}^2 u + \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 v = \operatorname{cn}^2 v + \operatorname{sn}^2 v \operatorname{dn}^2 u$$

を用いれば,

$$\begin{aligned} & \Delta^2 - (\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u)^2 \\ &= (\operatorname{cn}^2 u + \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 v)(\operatorname{cn}^2 v + \operatorname{sn}^2 v \operatorname{dn}^2 u) - (\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u)^2 \\ &= (\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{dn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} v)^2. \end{aligned}$$

補遺 1 : (2/3)cn, dn の加法定理

$$\therefore \operatorname{cn}^2(u+v) = \left(\frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{dn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} v}{\Delta} \right)^2.$$

dn の加法定理は次のようにして得る.

$$\operatorname{dn}^2(u+v) = 1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u+v) = 1 - k^2 \left(\frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{\Delta} \right)^2.$$

$$\Delta = \operatorname{dn}^2 u + k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{cn}^2 v = \operatorname{dn}^2 v + k^2 \operatorname{sn}^2 v \operatorname{cn}^2 u$$

を用いれば,

$$\begin{aligned} & \Delta^2 - k^2 (\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u)^2 \\ &= (\operatorname{dn}^2 u + k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{cn}^2 v)(\operatorname{dn}^2 v + k^2 \operatorname{sn}^2 v \operatorname{cn}^2 u) - k^2 (\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u)^2 \\ &= (\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v)^2, \end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{dn}^2(u+v) = \left(\frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{\Delta} \right)^2.$$

補遺 2 : (2/3) 加法定理の証明

(参考文献) J. V. Armitage & W. F. Eberlein: Elliptic Functions, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2006.

略記.

$$s_1 = \operatorname{sn} u, \quad c_1 = \operatorname{cn} u, \quad d_1 = \operatorname{dn} u,$$

$$s_2 = \operatorname{sn} v, \quad c_2 = \operatorname{cn} v, \quad d_2 = \operatorname{dn} v.$$

$$S(u, v) := \frac{s_1 c_2 d_2 + s_2 c_1 d_1}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2},$$

$$C(u, v) := \frac{c_1 c_2 - s_1 d_1 s_2 d_2}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2},$$

$$D(u, v) := \frac{d_1 d_2 - k^2 s_1 c_1 s_2 d_2}{1 - k^2 s_1^2 s_2^2}.$$

証明すべき等式.

$$\operatorname{sn}(u + v) = S(u, v), \quad \operatorname{cn}(u + v) = C(u, v), \quad \operatorname{dn}(u + v) = D(u, v).$$

補遺 2 : (2/3) 加法定理の証明

まず, $\operatorname{sn}(u+v) = S(u, v)$ から証明する.

$$S(u, v) = \frac{s_1 c_2 d_2 + s_2 c_1 d_1}{\Delta}, \quad \Delta = 1 - k^2 s_1^2 s_2^2,$$

$$\begin{aligned} \Delta^2 \frac{\partial S}{\partial u} &= \Delta \frac{\partial}{\partial u} (s_1 c_2 d_2 + s_2 c_1 d_1) - (s_1 c_2 d_2 + s_2 c_1 d_1) \frac{\partial \Delta}{\partial u} \\ &= \Delta \left[c_1 d_1 c_2 d_2 - s_2 (s_1 d_1^2 + k^2 s_1 c_1^2) \right] - (s_1 c_2 d_2 + s_2 c_1 d_1) (-2k^2 s_1 c_1 d_1 s_2^2) \\ &= c_1 d_1 c_2 d_2 (\Delta + 2k^2 s_1^2 s_2^2) - s_1 s_2 \left[\Delta (d_1^2 + k^2 c_1^2) - 2k^2 c_1^2 d_1^2 s_2^2 \right] \\ &= c_1 d_1 c_2 d_2 (1 + k^2 s_1^2 s_2^2) - s_1 s_2 \left[d_1^2 (\Delta - k^2 c_1^2 s_2^2) + k^2 c_1^2 (\Delta - s_2^2 d_1^2) \right] \\ &= c_1 d_1 c_2 d_2 (1 + k^2 s_1^2 s_2^2) - s_1 s_2 (d_1^2 d_2^2 + k^2 c_1^2 c_2^2) \\ &= (c_1 c_2 - s_1 s_2 d_1 d_2) (d_1 d_2 - k^2 s_1 s_2 c_1 c_2) \\ &= \Delta^2 CD. \end{aligned}$$

u, v についての対称性より,

$$\frac{\partial S}{\partial u} = \frac{\partial S}{\partial v} = CD.$$

補遺 2 : (2/3) 加法定理の証明

$z = u + v$, $w = u - v$ とおくと,

$$\frac{\partial S}{\partial w} = 0, \quad \therefore S(u, v) = f(z) = f(u + v),$$

ここで f は未知関数である.

f を求めるため $v = 0$ とおくと,

$$f(u) = \operatorname{sn} u, \quad \therefore S(u, v) = \operatorname{sn}(u + v).$$

次に, $\operatorname{dn}(u + v) = D(u, v)$, $\operatorname{cn}(u + v) = C(u, v)$ を示す. まず,

$$C^2(u, v) = 1 - S^2(u, v)$$

が成り立つことが示される ($\Delta = c_1^2 + s_1^2 d_2^2 = c_2^2 + s_2^2 d_1^2$ を用いる). よって,

$$\operatorname{cn}^2(u + v) = 1 - \operatorname{sn}^2(u + v) = 1 - S^2 = C^2, \quad \therefore \operatorname{cn}(u + v) = \pm C(u, v).$$

一方,

$$CD = \frac{\partial}{\partial u} \operatorname{sn}(u + v) = \operatorname{cn}(u + v) \operatorname{dn}(u + v), \quad (1)$$

$$\operatorname{cn}(u + v) \operatorname{dn}(u + v) = \pm \operatorname{cn}(u + v) D(u, v).$$

補遺 2 : (2/3) 加法定理の証明

$\operatorname{cn}(u+v) \neq 0$ ならば, $\operatorname{dn}(u+v) = \pm D(u+v)$. ここで,

$$D^2(u, v) = 1 - k^2 S^2(u, v) = 1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u+v) = \operatorname{dn}^2(u+v) \geq k'^2$$

が示される ($\Delta = d_1^2 + k^2 s_1^2 c_2^2 = d_2^2 + k^2 s_2^2 c_1^2$ を用いる) から,

$$D(u, v) \geq k', \quad \text{または} \quad D(u, v) \leq -k' \quad (\forall u, v \in \mathbb{R}).$$

$D(u, 0) = \operatorname{dn} u \geq k'$ より, $D(u, v) \geq k' \quad (\forall u, v \in \mathbb{R})$.

$\operatorname{dn}(u+v) \geq k' \quad (\forall u, v \in \mathbb{R})$ より

$$D(u, v) = \operatorname{dn}(u+v) \quad \text{if} \quad \operatorname{cn}(u+v) \neq 0.$$

極限を考えれば, すべての $u, v \in \mathbb{R}$ に対して上の式が成り立つ.

この結果を前頁 (1) に代入して,

$$C(u, v) = \operatorname{cn}(u+v) \quad \text{if} \quad \operatorname{dn}(u+v) \neq 0.$$

極限を考えれば, すべての $u, v \in \mathbb{R}$ に対して上の式が成り立つ. ■

補遺 3 : (3/3)sn, cn, dn の正則性の証明

$$S(u, v) := \operatorname{sn}(u + v) = \frac{\operatorname{sn} u \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v + \operatorname{sn} v \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v},$$

$$C(u, v) := \operatorname{cn}(u + v) = \frac{\operatorname{cn} u \operatorname{cn} v - \operatorname{sn} u \operatorname{dn} u \operatorname{sn} v \operatorname{dn} v}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v},$$

$$D(u, v) := \operatorname{dn}(u + v) = \frac{\operatorname{dn} u \operatorname{dn} v - k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}$$

とおくと,

$$\operatorname{sn}(u + iv) = S(u, iv) =: \tilde{S}(u, v),$$

$$\operatorname{cn}(u + iv) = C(u, iv) =: \tilde{C}(u, v),$$

$$\operatorname{dn}(u + iv) = D(u, iv) =: \tilde{D}(u, v).$$

$\tilde{S}(u, v)$, $\tilde{C}(u, v)$, $\tilde{D}(u, v)$ が Cauchy-Riemann 関係式を満たすことを示せばよい.

補遺 3 : (3/3)sn, cn, dn の正則性の証明

加法定理の証明の計算より,

$$\frac{\partial S(u, v)}{\partial u} = \frac{\partial S(u, v)}{\partial v} = C(u, v)D(u, v). \quad (2)$$

$$\frac{d \operatorname{sn}(iv)}{d(iv)} = \operatorname{cn}(iv) \operatorname{dn}(iv), \quad \frac{d \operatorname{cn}(iv)}{d(iv)} = -\operatorname{sn}(iv) \operatorname{dn}(iv), \quad \frac{d \operatorname{dn}(iv)}{d(iv)} = -k^2 \operatorname{sn}(iv) \operatorname{cn}(iv)$$

の成立が確かめられるから, (2) で $v \rightarrow iv$ とおいた式が成り立つ.

$$\frac{\partial \tilde{S}(u, v)}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{S}(u, v)}{\partial (iv)}.$$

変数を $z = u + iv$, $\bar{z} = u - iv$ に変換すると, 上の式は次に書き換えられる.

$$\frac{\partial \tilde{S}}{\partial \bar{z}} = 0.$$

これは, $\tilde{S}(u, v)$ に対する Cauchy-Riemann 関係式と同値である.

補遺 3 : (3/3)sn, cn, dn の正則性の証明

$C(u, v) = \text{cn}(u + v)$ であるから,

$$\frac{\partial C(u, v)}{\partial u} = \frac{\partial C(u, v)}{\partial v} = \left. \frac{\partial \text{cn } \zeta}{\partial \zeta} \right|_{\zeta=u+v} = -S(u, v)D(u, v).$$

前頁と同じ理由より, $v \rightarrow iv$ とおくことができる.

$$\frac{\partial \tilde{C}(u, v)}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{C}(u, v)}{\partial (iv)}.$$

$z = u + iv, \bar{z} = u - iv$ と変数変換すると,

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial \bar{z}} = 0.$$

これは, $\tilde{C}(u, v)$ に対する Cauchy-Riemann 関係式と同値である.

同様にして, $\tilde{D}(u, v)$ に対する Cauchy-Riemann 関係式も示される.

補遺4 : (3/3)sn, cn, dn の零点・極

- $\operatorname{sn} z$ の $z = 2mK + 2niK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) における零点が1位であること.

$$\therefore \left. \frac{d \operatorname{sn} z}{dz} \right|_{z=2mK+2niK'} = \operatorname{cn} z \operatorname{dn} z \Big|_{z=2mK+2niK'} \neq 0.$$

- 同様にして, $\operatorname{cn} z$ の $z = (2m+1)K + 2niK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) における零点, $\operatorname{dn} z$ の $z = (2m+1)K + (2n+1)iK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) における零点も1位であることが示される.
- $\operatorname{sn} z$ の $z = 2mK + (2n+1)iK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) における特異点が1位の極であること.
 $\therefore \operatorname{sn} z = 1/\{k \operatorname{sn}(z - iK')\}$ であり, $\operatorname{sn}(z - iK')$ は $z = 2mK + (2n+1)iK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) に1位の零点を持つから.
- $\operatorname{cn} z$ の $z = 2mK + (2n+1)iK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) における特異点が1位の極であること.
 $\therefore \operatorname{cn}(z; k) = 1/\operatorname{cn}(iz; k')$ であり, $\operatorname{cn}(iz; k')$ は $iz = (2n+1)K' + 2miK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$), すなわち, $z = 2mK + (2n+1)iK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) に1位の零点を持つから.

- $\operatorname{dn} z$ の $z = 2mK + (2n + 1)iK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) における特異点が 1 位の極であること.

∴

$$\operatorname{dn} z = -i \frac{\operatorname{cn}(z - iK')}{\operatorname{sn}(z - iK')}.$$

分母・分子の $z = 2mK + 2niK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) における 1 位の極は互いに打ち消しあう. よって, $\operatorname{dn} z$ は $\operatorname{sn}(z - iK')$ の 1 位の零点 $z = 2mK + (2n + 1)iK'$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) に 1 位の極を持つ.