解析力学 (4) ・ 解析力学のための幾何学

幾何学的視点から

緒方秀教

電気通信大学大学院 情報・ネットワーク工学専攻

January 2, 2022

はじめに

- 解析力学は座標（人間のモノサシ）の選び方で不変な力学の定式化である。
- Hamilton 形式の力学：力学の幾何学的側面をあらわにしている。
幾何学：変換に対して不変なものを調べる学問。

今回の予定

解析力学の幾何学を究めるために、**微分幾何**の知識を準備する。

- 接ベクトル
- 微分形式
- くさび積
- 外微分
- 微分形式の積分（Stokes の定理）

今回の内容

- ① はじめに
- ② 接ベクトル・1形式
- ③ 微分形式とくさび積
- ④ 外微分
- ⑤ 微分形式の積分
- ⑥ まとめ

今回の内容

- ① はじめに
- ② 接ベクトル・1 形式
- ③ 微分形式とくさび積
- ④ 外微分
- ⑤ 微分形式の積分
- ⑥ まとめ

接ベクトル・1形式：接ベクトル

配位空間：粒子系が運動する空間。

$$M := \{ \mathbf{r}(q^1, q^2, \dots, q^N) \in \mathbb{R}^{3N_{\text{particle}}} \mid (q^1, q^2, \dots, q^N) \in D \} \quad (D \subset \mathbb{R}^N).$$

M 上の接ベクトル場

$$X = X^\alpha(q) \partial_\alpha = X^\alpha(q) \frac{\partial}{\partial q^\alpha} \quad \left(\partial_\alpha = \frac{\partial}{\partial q^\alpha} \right).$$

- 記号 " r " は略する。 $\partial \mathbf{r} / \partial q^\alpha \rightarrow \partial / \partial q^\alpha$.
接ベクトル=方向微分。
- Einstein の規約。

$$T^{\alpha\dots} S_{\alpha\dots} = \sum_{\alpha=1}^N T^{\alpha\dots} S_{\alpha\dots}.$$

接ベクトル・1形式：1形式

M 上の微分 1 形式, あるいは単に, **1 形式**

- M 上のコベクトル場 ω , i.e., 線形形式 $\omega : X$ (ベクトル場) $\mapsto \langle \omega | X \rangle$ (スカラー場).
- **双対基底**: $\{dq^\alpha\}_{\alpha=1}^N$.

$$\langle dq^\alpha | \partial_\beta \rangle = \delta_\beta^\alpha = \begin{cases} 1 & (\alpha = \beta) \\ 0 & (\alpha \neq \beta). \end{cases}$$

1形式の座標表示

$$\omega = \omega_\alpha(q) dq^\alpha, \quad \omega_\alpha(q) = \langle \omega | \partial_\alpha \rangle \quad (\alpha = 1, \dots, N).$$

接ベクトル・1形式：座標変換における変換則

座標変換（点変換） $(q^1, \dots, q^N) \rightarrow (Q^1, \dots, Q^N)$ における接ベクトル，1形式の変換則．

$$X = X^\alpha(q) \frac{\partial}{\partial q^\alpha} = \tilde{X}^\alpha(Q) \frac{\partial}{\partial Q^\alpha}, \quad \omega = \omega_\alpha(q) dq^\alpha = \tilde{\omega}_\alpha(Q) dQ^\alpha.$$

$$\frac{\partial}{\partial q^\alpha} = \frac{\partial Q^\beta}{\partial q^\alpha} \frac{\partial}{\partial Q^\beta}, \quad dq^\alpha = \frac{\partial q^\alpha}{\partial Q^\beta} dQ^\beta \text{ を用いて,}$$

$$\tilde{X}^\alpha(Q) = \frac{\partial Q^\alpha}{\partial q^\beta} X^\beta(q) \quad \text{反変ベクトル,} \quad \tilde{\omega}_\alpha(Q) = \frac{\partial q^\beta}{\partial Q^\alpha} \omega_\beta(q) \quad \text{共変ベクトル.}$$

$$\langle \omega | X \rangle = X^\alpha(q) \omega_\alpha(q) = \tilde{X}^\alpha(Q) \tilde{\omega}_\alpha(Q) \quad \text{スカラー（座標変換で不変）.}$$

今回の内容

- ① はじめに
- ② 接ベクトル・1形式
- ③ 微分形式とくさび積**
- ④ 外微分
- ⑤ 微分形式の積分
- ⑥ まとめ

微分形式とくさび積：1形式のくさび積

1形式 ω, η のくさび積.

$$\omega \wedge \eta = (\omega_\alpha(q) dq^\alpha) \wedge (\eta_\beta(q) dq^\beta) := \omega_\alpha(q) \eta_\beta(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta.$$

くさび積 $\wedge$ のルール

- $\circ \wedge \bullet$ は $\circ, \bullet$ それぞれについて線形である.
- **反可換性**：双対基底 $\{dq^\alpha\}$ に対して, $dq^\beta \wedge dq^\alpha = -dq^\alpha \wedge dq^\beta$, とくに, $dq^\alpha \wedge dq^\alpha = 0$.

微分形式とくさび積：微分2形式，くさび積 $\wedge$ の演算例

(例) $N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$ の場合.

通常ベクトル $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$ に次の1形式を対応させる.

$$\omega_a = a_x dx + a_y dy + a_z dz, \quad \omega_b = b_x dx + b_y dy + b_z dz.$$

微分形式とくさび積：微分2形式，くさび積 $\wedge$ の演算例

(例) $N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$ の場合.

通常ベクトル $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$ に次の1形式を対応させる.

$$\omega_a = a_x dx + a_y dy + a_z dz, \quad \omega_b = b_x dx + b_y dy + b_z dz.$$

$$\begin{aligned} \omega_a \wedge \omega_b &= (a_x dx + a_y dy + a_z dz) \wedge (b_x dx + b_y dy + b_z dz) \\ &= a_x b_x \underbrace{dx \wedge dx}_0 + a_x b_y dx \wedge dy + a_x b_z \underbrace{dx \wedge dz}_{-dz \wedge dx} + a_y b_x \underbrace{dy \wedge dx}_{-dx \wedge dy} + a_y b_y \underbrace{dy \wedge dy}_0 + a_y b_z dy \wedge dz \\ &\quad + a_z b_x dz \wedge dx + a_z b_y \underbrace{dz \wedge dy}_{-dy \wedge dz} + a_z b_z \underbrace{dz \wedge dz}_0 \end{aligned}$$

くさび積 $\wedge$ の反可換性を使う

$$= (a_y b_z - a_z b_y) dy \wedge dz + (a_z b_x - a_x b_z) dz \wedge dx + (a_x b_y - a_y b_x) dx \wedge dy.$$

微分形式とくさび積：微分2形式，くさび積 $\wedge$ の演算例

(例) $N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$ の場合.

通常のベクトル $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$ に次の1形式を対応させる.

$$\omega_a = a_x dx + a_y dy + a_z dz, \quad \omega_b = b_x dx + b_y dy + b_z dz.$$

$$\begin{aligned} \omega_a \wedge \omega_b &= (a_x dx + a_y dy + a_z dz) \wedge (b_x dx + b_y dy + b_z dz) \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) dy \wedge dz + (a_z b_x - a_x b_z) dz \wedge dx + (a_x b_y - a_y b_x) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

ベクトルの外積 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ の成分が現れた.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x).$$

微分形式とくさび積：2形式

2形式

$$\omega = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta.$$

1形式 ξ と 2形式 ω のくさび積.

$$\xi \wedge \omega = (\xi_\alpha(q) dq^\alpha) \wedge \left(\frac{1}{2!} \omega_{\beta\gamma}(q) dq^\beta \wedge dq^\gamma \right) := \frac{1}{2!} \xi_\alpha(q) \omega_{\beta\gamma}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta \wedge dq^\gamma.$$

微分形式とくさび積：2形式

2形式

$$\omega = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta.$$

1形式 ξ と 2形式 ω のくさび積.

$$\xi \wedge \omega = (\xi_\alpha(q) dq^\alpha) \wedge \left(\frac{1}{2!} \omega_{\beta\gamma}(q) dq^\beta \wedge dq^\gamma \right) := \frac{1}{2!} \xi_\alpha(q) \omega_{\beta\gamma}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta \wedge dq^\gamma.$$

3形式 $\zeta = \frac{1}{3!} \zeta_{\alpha\beta\gamma}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta \wedge dq^\gamma.$

微分形式とくさび積

1 形式 ξ と 3 形式 ω のくさび積.

$$\xi \wedge \omega = (\xi_\alpha(q) dq^\alpha) \wedge \left(\frac{1}{3!} \omega_{\beta\gamma\delta}(q) dq^\beta \wedge dq^\gamma \wedge dq^\delta \right) := \frac{1}{3!} \xi_\alpha(q) \omega_{\beta\gamma\delta}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta \wedge dq^\gamma \wedge dq^\delta.$$

2 形式 η, ζ のくさび積.

$$\eta \wedge \zeta = \left(\frac{1}{2!} \eta_{\alpha\beta}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta \right) \wedge \left(\frac{1}{2!} \zeta_{\gamma\delta}(q) dq^\gamma \wedge dq^\delta \right) := \frac{1}{(2!)^2} \eta_{\alpha\beta}(q) \zeta_{\gamma\delta}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta \wedge dq^\gamma \wedge dq^\delta.$$

$$4 \text{ 形式 } \zeta = \frac{1}{4!} \zeta_{\alpha\beta\gamma\delta}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta \wedge dq^\gamma \wedge dq^\delta.$$

以降, 同様にして 5 形式, 6 形式, ... が作られる.

k 形式

$$\omega = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k}.$$

微分形式とくさび積：計算例

$N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$ の場合.

通常のベクトル $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$ にそれぞれ次の 1 形式 ξ_a , 2 形式 ω_b を対応させる.

$$\xi_a = a_x dx + a_y dy + a_z dz, \quad \omega_b = b_x dy \wedge dz + b_y dz \wedge dx + b_z dx \wedge dy.$$

$$\begin{aligned} \xi_a \wedge \omega_b &= (a_x dx + a_y dy + a_z dz) \wedge (b_x dy \wedge dz + b_y dz \wedge dx + b_z dx \wedge dy) \\ &= a_x b_x dx \wedge dy \wedge dz + a_x b_y \underbrace{dx \wedge dz \wedge dx}_0 + a_x b_z \underbrace{dx \wedge dx \wedge dy}_0 \\ &\quad + a_y b_x \underbrace{dy \wedge dy \wedge dz}_0 + a_y b_y dy \wedge dz \wedge dx + a_y b_z \underbrace{dx \wedge dz \wedge dx}_0 \\ &\quad + a_z b_x \underbrace{dz \wedge dy \wedge dz}_0 + a_z b_y \underbrace{dz \wedge dz \wedge dx}_0 + a_z b_z dz \wedge dx \wedge dy. \end{aligned}$$

くさび積は同じものが現れると 0 になることを用いた.

$dy \wedge dz \wedge dx = -dy \wedge dx \wedge dz = dx \wedge dy \wedge dz$ などを用いて,

微分形式とくさび積：計算例

$N = 3, (q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$ の場合.

通常のベクトル $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z), \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$ にそれぞれ次の 1 形式 ξ_a , 2 形式 ω_b を対応させる.

$$\xi_a = a_x dx + a_y dy + a_z dz, \quad \omega_b = b_x dy \wedge dz + b_y dz \wedge dx + b_z dx \wedge dy.$$

$$\xi_a \wedge \omega_b = (a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z) dx \wedge dy \wedge dz = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) dx \wedge dy \wedge dz.$$

内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ が現れた.

微分形式とくさび積

- $k > N$ なる k 形式は 0 しか存在しない。

$\therefore k > N$ の場合, $dq^{\alpha_1}, \dots, dq^{\alpha_k}$ のどれか二つが必ず一致して $dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k} = 0$ となるから。

- 2 形式 $\omega = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta}(q) dq^\alpha \wedge dq^\beta$ に対して,

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{1}{2!} \sum_{\alpha < \beta} (\omega_{\alpha\beta} dq^\alpha \wedge dq^\beta + \omega_{\beta\alpha} dq^\beta \wedge dq^\alpha) \\ &= \frac{1}{2!} \sum_{\alpha < \beta} (\omega_{\alpha\beta} - \omega_{\beta\alpha}) dq^\alpha \wedge dq^\beta. \end{aligned}$$

係数は添字 α, β の入れ替えで符号が反転するものだけが残る。一般の k 形式も同様。

微分形式の係数は添字の入れ替えで符号が反転するとしておく。

$$\omega = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k}, \quad \omega_{\dots\beta\dots\alpha\dots}(q) = -\omega_{\dots\alpha\dots\beta\dots}(q).$$

微分形式とくさび積

- 「1形式=コベクトル（線形形式）：ベクトルを投げるとスカラーを返す」だった。
- 2形式 ω ：双線型形式とするのが自然。

$\omega : (X, Y) \mapsto \langle \omega | X, Y \rangle$ (スカラー), ベクトル X, Y それぞれについて線形.

$\omega = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta} X^{\alpha\beta}$ とすると,

$$\langle \omega | X, Y \rangle = \frac{1}{2!} \omega_{\alpha\beta} \langle dq^{\alpha} \wedge dq^{\beta} | X, Y \rangle.$$

$\langle dq^{\alpha} \wedge dq^{\beta} | X, Y \rangle$ をどう定めるか？

微分形式とくさび積

仮に次のように定義してみる.

$$\langle dq^\alpha \wedge dq^\beta | X, Y \rangle \stackrel{?}{=} \langle dq^\alpha | X \rangle \langle dq^\beta | Y \rangle.$$

くさび積 $\wedge$ の反可換性より,

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= -\langle dq^\beta \wedge dq^\alpha | X, Y \rangle = -\langle dq^\beta | X \rangle \langle dq^\alpha | Y \rangle, \\ &\langle dq^\alpha | X \rangle \langle dq^\beta | Y \rangle = -\langle dq^\beta | X \rangle \langle dq^\alpha | Y \rangle \text{ !?} \end{aligned}$$

そこで, 次のように定義し直す.

$$\langle dq^\alpha \wedge dq^\beta | X, Y \rangle = \langle dq^\alpha | X \rangle \langle dq^\beta | Y \rangle - \langle dq^\alpha | Y \rangle \langle dq^\beta | X \rangle.$$

この時,

$$\text{左辺} = -\langle dq^\beta \wedge dq^\alpha | X, Y \rangle = -\langle dq^\beta | X \rangle \langle dq^\alpha | Y \rangle + \langle dq^\beta | Y \rangle \langle dq^\alpha | X \rangle = \text{右辺}.$$

矛盾は解消された.

微分形式とくさび積：2形式

双線型形式としての2形式

$\omega = \frac{1}{2!}\omega_{\alpha\beta}(q)dq^\alpha \wedge dq^\beta$ は次を満たす双線型形式とする

(ベクトル場 X, Y を投げるとスカラー場 $\langle \omega | X, Y \rangle$ を返す) .

- $\langle \omega | X, Y \rangle$ は X, Y それぞれについて線形である.
- $\langle dq^\alpha \wedge dq^\beta | X, Y \rangle = \langle dq^\alpha | X \rangle \langle dq^\beta | Y \rangle - \langle dq^\alpha | Y \rangle \langle dq^\beta | X \rangle$, とくに,

$$\langle dq^\alpha \wedge dq^\beta | \partial_\gamma, \partial_\delta \rangle = \delta_\gamma^\alpha \delta_\delta^\beta - \delta_\delta^\alpha \delta_\gamma^\beta.$$

$$\langle \omega | X, Y \rangle = \frac{1}{2!}\omega_{\alpha\beta} X^\gamma Y^\delta \langle dq^\alpha \wedge dq^\beta | \partial_\gamma, \partial_\delta \rangle = \frac{1}{2!}\omega_{\alpha\beta} (X^\alpha Y^\beta - Y^\alpha X^\beta),$$

$$\therefore \langle \omega | Y, X \rangle = -\langle \omega | X, Y \rangle.$$

ω は交代双線型形式である.

微分形式とくさび積： k 形式

多重線型形式としての k 形式

$\omega = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k}$ は次を満たす k 重線型形式とする

(ベクトル場 $X_{(1)}, \dots, X_{(k)}$ を投げるとスカラー場 $\langle \omega | X_{(1)}, \dots, X_{(k)} \rangle$ を返す) .

- $\langle \omega | X_{(1)}, \dots, X_{(k)} \rangle$ は $X_{(1)}, \dots, X_{(k)}$ それぞれについて線形である.

- $\langle dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k} | \partial_{\beta_1}, \dots, \partial_{\beta_k} \rangle = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} (\text{sgn } \sigma) \delta_{\beta_1}^{\alpha_{\sigma(1)}} \dots \delta_{\beta_k}^{\alpha_{\sigma(k)}}.$

$\mathfrak{S}_k : (1, 2, \dots, k)$ の置換の集合 (k 次の対称群) .

$$\text{sgn } \sigma = \begin{cases} +1 & (\sigma \text{ は偶置換}) \\ -1 & (\sigma \text{ は奇置換}). \end{cases}$$

微分形式とくさび積： k 形式

多重線型形式としての k 形式

$\omega = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k}$ は次を満たす k 重線型形式とする

(ベクトル場 $X_{(1)}, \dots, X_{(k)}$ を投げるとスカラー場 $\langle \omega | X_{(1)}, \dots, X_{(k)} \rangle$ を返す) .

- $\langle \omega | X_{(1)}, \dots, X_{(k)} \rangle$ は $X_{(1)}, \dots, X_{(k)}$ それぞれについて線形である .

- $\langle dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k} | \partial_{\beta_1}, \dots, \partial_{\beta_k} \rangle = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} (\text{sgn } \sigma) \delta_{\beta_1}^{\alpha_{\sigma(1)}} \dots \delta_{\beta_k}^{\alpha_{\sigma(k)}} .$

$$\langle \omega | X_{(1)}, \dots, X_{(k)} \rangle = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_k} (\text{sgn } \sigma) X_{(1)}^{\alpha_{\sigma(1)}} \dots X_{(k)}^{\alpha_{\sigma(k)}} .$$

ω は**交代** k 重線形形式である ($X_{(1)}, \dots, X_{(k)}$ の 2 個を入れ替えると符号を変える) .

微分形式とくさび積：計算例

$$N = 3, (q^1, q^2, q^3) = (x, y, z).$$

ベクトル $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ に次の 2 形式 ω を対応させる.

$$\omega = \omega_x dy \wedge dz + \omega_y dz \wedge dx + \omega_z dx \wedge dy.$$

ベクトル $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$ にそれぞれ次のベクトル X_a, X_b を対応させる.

$$X_a = a_x \partial_x + a_y \partial_y + a_z \partial_z. \quad X_b = b_x \partial_x + b_y \partial_y + b_z \partial_z.$$

$$\begin{aligned} \langle \omega | X_a, X_b \rangle &= \omega_x \langle dy \wedge dz | a_x \partial_x + a_y \partial_y + a_z \partial_z, b_x \partial_x + b_y \partial_y + b_z \partial_z \rangle \\ &\quad + \omega_y \langle dz \wedge dx | a_x \partial_x + a_y \partial_y + a_z \partial_z, b_x \partial_x + b_y \partial_y + b_z \partial_z \rangle \\ &\quad + \omega_z \langle dx \wedge dy | a_x \partial_x + a_y \partial_y + a_z \partial_z, b_x \partial_x + b_y \partial_y + b_z \partial_z \rangle \\ &= \omega_x (a_y b_z - a_z b_y) + \omega_y (a_z b_x - a_x b_z) + \omega_z (a_x b_y - a_y b_x) \\ &= \boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}). \end{aligned}$$

微分形式とくさび積：計算例

$$N = 3, (q^1, q^2, q^3) = (x, y, z).$$

ベクトル $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ に次の 2 形式 ω を対応させる.

$$\omega = \omega_x dy \wedge dz + \omega_y dz \wedge dx + \omega_z dx \wedge dy.$$

ベクトル $a = (a_x, a_y, a_z), b = (b_x, b_y, b_z)$ にそれぞれ次のベクトル X_a, X_b を対応させる.

$$X_a = a_x \partial_x + a_y \partial_y + a_z \partial_z. \quad X_b = b_x \partial_x + b_y \partial_y + b_z \partial_z.$$

$$\begin{aligned} \langle \omega | X_a, X_b \rangle &= \omega \cdot (a \times b) \\ &= \omega, a, b \text{ の張る平行六面体の体積} \\ &= \omega \cdot \left(\begin{array}{c} a, b \text{ の張る平行四辺形の} \\ \text{面積ベクトル} \end{array} \right). \end{aligned}$$

微分形式とくさび積：微分形式の変換則

座標変換（点変換） $(q^\alpha) \rightarrow (Q^\alpha)$ に対し，

$$\omega = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k} = \frac{1}{k!} \tilde{\omega}_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(Q) dQ^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dQ^{\alpha_k},$$

$dq^\alpha = \frac{\partial q^\alpha}{\partial Q^\beta} dQ^\beta$ を用いて，

$$\tilde{\omega}_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(Q) = \omega_{\beta_1 \dots \beta_k}(q) \frac{\partial q^{\beta_1}}{\partial Q^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial q^{\beta_k}}{\partial Q^{\alpha_k}} \quad k \text{ 階共変テンソル場,}$$

ベクトル場 $X_{(1)}, \dots, X_{(k)}$ に対し，

$$\langle \omega | X_{(1)}, \dots, X_{(k)} \rangle = \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) X_{(1)}^{\alpha_1}(q) \dots X_{(k)}^{\alpha_k}(q) = \tilde{\omega}_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(Q) \tilde{X}_{(1)}^{\alpha_1}(Q) \dots X_{(k)}^{\alpha_k}(Q).$$

変数変換で不変である（スカラー）。

今回の内容

- ① はじめに
- ② 接ベクトル・1形式
- ③ 微分形式とくさび積
- ④ 外微分**
- ⑤ 微分形式の積分
- ⑥ まとめ

外微分

微分形式の微分.

k 形式 ω の外微分 $d\omega$

- 関数 (0 形式) f の外微分

$$df = \partial_\alpha f(q) dq^\alpha \quad (1 \text{ 形式})$$

- k 形式 $\omega = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k}$ の外微分 $d\omega$

$$d\omega := \frac{1}{k!} \partial_\beta \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^\beta \wedge dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k} \quad ((k+1) \text{ 形式}).$$

外微分 ($N = 3$, ベクトル解析との関連)

(例) $N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$.

$$df = \partial_x f dx + \partial_y f dy + \partial_z f dz \quad \leftrightarrow \quad \text{grad } f = \nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f) \quad (\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)).$$

外微分 ($N = 3$, ベクトル解析との関連)

(例) $N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$.

$$df = \partial_x f dx + \partial_y f dy + \partial_z f dz \quad \leftrightarrow \quad \text{grad } f = \nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f) \quad (\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)).$$

1 形式 $\omega_A = A_x dx + A_y dy + A_z dz$ に対し,

$$\begin{aligned} d\omega_A &= (\partial_x A_x dx + \partial_x A_x dy + \partial_z A_x dz) \wedge dx + (\partial_x A_y dx + \partial_y A_y dy + \partial_z A_y dz) \wedge dy \\ &\quad + (\partial_x A_z dx + \partial_y A_z dy + \partial_z A_z dz) \wedge dz \\ &\quad (\text{dx} \wedge \text{dx} = 0 \text{ etc. により赤字の項は消えて}) \\ &= \partial_y A_x dy \wedge dx + \partial_z A_x dz \wedge dx + \partial_x A_y dx \wedge dy + \partial_z A_y dz \wedge dy + \partial_x A_z dx \wedge dz + \partial_y A_z dy \wedge dz \\ &\quad (\text{dy} \wedge \text{dx} = -\text{dx} \wedge \text{dy}, \text{ etc. により青字の符号を反転させて}) \\ &= (\partial_y A_z - \partial_z A_y) dy \wedge dz + (\partial_z A_x - \partial_x A_z) dz \wedge dx + (\partial_x A_y - \partial_y A_x) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

外微分 ($N = 3$, ベクトル解析との関連)

(例) $N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$.

$$df = \partial_x f dx + \partial_y f dy + \partial_z f dz \quad \leftrightarrow \quad \text{grad } f = \nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f) \quad (\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)).$$

1 形式 $\omega_A = A_x dx + A_y dy + A_z dz$ に対し,

$$d\omega_A = (\partial_y A_z - \partial_z A_y) dy \wedge dz + (\partial_z A_x - \partial_x A_z) dz \wedge dx + (\partial_x A_y - \partial_y A_x) dx \wedge dy.$$

rot $\mathbf{A}$ が現れる.

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = (\partial_y A_z - \partial_z A_y, \partial_z A_x - \partial_x A_z, \partial_x A_y - \partial_y A_x).$$

外微分 ($N = 3$, ベクトル解析との関連)

(例) $N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$.

$$df = \partial_x f dx + \partial_y f dy + \partial_z f dz \quad \leftrightarrow \quad \text{grad } f = \nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f) \quad (\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)).$$

1 形式 $\omega_A = A_x dx + A_y dy + A_z dz$ に対し,

$$d\omega_A = (\partial_y A_z - \partial_z A_y) dy \wedge dz + (\partial_z A_x - \partial_x A_z) dz \wedge dx + (\partial_x A_y - \partial_y A_x) dx \wedge dy.$$

rot $\mathbf{A}$ が現れる.

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = (\partial_y A_z - \partial_z A_y, \partial_z A_x - \partial_x A_z, \partial_x A_y - \partial_y A_x).$$

同様に, 2 形式 $\omega_A = A_x dy \wedge dz + A_y dz \wedge dx + A_z dx \wedge dy$ に対しては,

$$d\omega_A = (\partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z) dx \wedge dy \wedge dz.$$

div $\mathbf{A}$ が現れる.

$$\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z.$$

外微分

外微分を 2 度行くと 0 になる

$$d^2 = 0.$$

外微分

外微分を 2 度行くと 0 になる

$$d^2 = 0.$$

$N = 3, (q^1, q^2, q^3) = (x, y, z),$

- 関数 (0 形式) f に対しては,

$$d^2 f = 0 \quad \leftrightarrow \quad \text{rot}(\text{grad } f) = \nabla \times \nabla f = \mathbf{0}.$$

- 1 形式 $\omega_A = A_x dx + A_y dy + A_z dz$ に対しては,

$$d^2 \omega_A = 0 \quad \leftrightarrow \quad \text{div}(\text{rot } \mathbf{A}) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

外微分

外微分を 2 度行くと 0 になる

$$d^2 = 0.$$

(証明) 外微分の定義より,

$$\begin{aligned} d^2\omega &= \frac{1}{k!} d \left(\frac{\partial\omega_{\alpha_1\dots\alpha_k}}{\partial q^\beta} dq^\beta \wedge q^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k} \right) \\ &= \frac{1}{k!} \frac{\partial^2\omega_{\alpha_1\dots\alpha_k}}{\partial q^\gamma \partial q^\beta} dq^\gamma \wedge dq^\beta \wedge dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k}, \end{aligned}$$

$$\text{青文字} \stackrel{(1)}{=} \frac{\partial^2\omega_{\alpha_1\dots\alpha_k}}{\partial q^\beta \partial q^\gamma} dq^\beta \wedge dq^\gamma \stackrel{(2)}{=} -\frac{\partial^2\omega_{\alpha_1\dots\alpha_k}}{\partial q^\gamma \partial q^\beta} dq^\gamma \wedge dq^\beta = -\text{青文字}.$$

((1) は添字の付替 $\beta \leftrightarrow \gamma$, (2) は $dq^\beta \wedge dq^\gamma = -dq^\gamma \wedge dq^\beta$ と偏微分の順序交換による)

$$\therefore \text{青文字} = 0.$$

外微分

次の公式は頻繁に用いる.

- $T_{\alpha\beta}$: 添字 α, β の入れ替えに対して**対称**である : $T_{\alpha\beta} = T_{\beta\alpha}$.
- $S^{\alpha\beta}$: 添字 α, β の入れ替えに対して**反対称**である : $S^{\alpha\beta} = -S^{\beta\alpha}$.

↓

$$T_{\alpha\beta} S^{\alpha\beta} = \sum_{\alpha, \beta=1}^N T_{\alpha\beta} S^{\alpha\beta} = 0.$$

くさび積の外微分

k 形式 ω , l 形式 η に対し,

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta.$$

外微分

閉形式・完全形式

- 微分形式 ω は閉形式である.

$$\stackrel{\text{def.}}{\iff} d\omega = 0.$$

- 微分形式 ω は完全形式である.

$$\stackrel{\text{def.}}{\iff} \exists \eta \text{ s.t. } \omega = d\eta.$$

外微分

閉形式・完全形式

- 微分形式 ω は閉形式である.

$$\stackrel{\text{def.}}{\iff} d\omega = 0.$$

- 微分形式 ω は完全形式である.

$$\stackrel{\text{def.}}{\iff} \exists \eta \text{ s.t. } \omega = d\eta.$$

- 完全形式は閉形式である ($\because d^2 = 0$ であるから).
- 閉形式が完全形式であるか?
  - 微分形式を考えている空間 M の位相幾何学的性質に依る (de Rham コホモロジー).
  - Poincaré の補題: M が連続変形で 1 点に収縮可能ならば, M 上の閉形式は完全形式である.

M は 1 点に収縮可能.

外微分

外微分は座標の選び方に依らない,

外微分

外微分は座標の選び方に依らない,

(証明) (Q^α) による外微分の表示.

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{k!} \frac{\partial \tilde{\omega}_{\alpha_1 \dots \alpha_k}}{\partial Q^\beta} dQ^\beta \wedge dQ^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dQ^{\alpha_k} \\
 = & \frac{1}{k!} \frac{\partial}{\partial Q^\beta} \left(\omega_{\gamma_1 \dots \gamma_k} \frac{\partial q^{\gamma_1}}{\partial Q^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial q^{\gamma_k}}{\partial Q^{\alpha_k}} \right) dQ^\beta \wedge dQ^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dQ^{\alpha_k} \\
 = & \frac{1}{k!} \frac{\partial \omega_{\gamma_1 \dots \gamma_k}}{\partial Q^\beta} \frac{\partial q^{\gamma_1}}{\partial Q^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial q^{\gamma_k}}{\partial Q^{\alpha_k}} \frac{\partial Q^\beta}{\partial q^\delta} dq^\delta \wedge \frac{\partial Q^{\alpha_1}}{\partial q^{\epsilon_1}} dq^{\epsilon_1} \wedge \dots \wedge \frac{\partial Q^{\alpha_k}}{\partial q^{\epsilon_k}} dq^{\epsilon_k} \\
 & + \frac{1}{k!} \omega_{\gamma_1 \dots \gamma_k} \underbrace{\left(\frac{\partial^2 q^{\gamma_1}}{\partial Q^\beta \partial Q^{\alpha_1}} \frac{\partial q^{\gamma_2}}{\partial Q^{\alpha_2}} \dots \frac{\partial q^{\gamma_k}}{\partial Q^{\alpha_k}} + \dots \right)}_{(1)} \underbrace{dQ^\beta \wedge dQ^{\alpha_1}}_{(2)} \wedge \dots \wedge dQ^{\alpha_k}.
 \end{aligned}$$

ここで, (1) は添字 β, α_1 について対称, (2) は添字 β, α_1 について反対称であるから, 青字部分=0 である.

外微分

外微分は座標の選び方に依らない,

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{k!} \frac{\partial \tilde{\omega}_{\alpha_1 \dots \alpha_k}}{\partial Q^\beta} dQ^\beta \wedge dQ^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dQ^{\alpha_k} \\
 = & \frac{1}{k!} \frac{\partial \omega_{\gamma_1 \dots \gamma_k}}{\partial Q^\beta} \frac{\partial q^{\gamma_1}}{\partial Q^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial q^{\gamma_k}}{\partial Q^{\alpha_k}} \frac{\partial Q^\beta}{\partial q^\delta} dq^\delta \wedge \frac{\partial Q^{\alpha_1}}{\partial q^{\epsilon_1}} dq^{\epsilon_1} \wedge \dots \wedge \frac{\partial Q^{\alpha_k}}{\partial q^{\epsilon_k}} dq^{\epsilon_k} \\
 = & \frac{1}{k!} \underbrace{\frac{\partial \omega_{\gamma_1 \dots \gamma_k}}{\partial Q^\beta} \frac{\partial Q^\beta}{\partial q^\delta}}_{\partial \omega_{\gamma_1 \dots \gamma_k} / \partial q^\delta} \underbrace{\frac{\partial q^{\gamma_1}}{\partial Q^{\alpha_1}} \frac{\partial Q^{\alpha_1}}{\partial q^{\epsilon_1}} \dots \frac{\partial q^{\gamma_k}}{\partial Q^{\alpha_k}} \frac{\partial Q^{\alpha_k}}{\partial q^{\epsilon_k}}}_{\delta_{\epsilon_1}^{\gamma_1} \dots \delta_{\epsilon_k}^{\gamma_k}} dq^\delta \wedge dq^{\epsilon_1} \wedge \dots \wedge dq^{\epsilon_k} \\
 = & \frac{1}{k!} \frac{\partial \omega_{\gamma_1 \dots \gamma_k}}{\partial q^\delta} dq^\delta \wedge dq^{\gamma_1} \wedge \dots \wedge dq^{\gamma_k} \quad ((q^\alpha) \text{ による外微分の表示}).
 \end{aligned}$$

今回の内容

- ① はじめに
- ② 接ベクトル・1形式
- ③ 微分形式とくさび積
- ④ 外微分
- ⑤ 微分形式の積分**
- ⑥ まとめ

微分形式の積分

微分形式 (交代多重線形形式)

ベクトルを投げると、面積・体積を返す。

3次元 Euclid 空間の場合。

$$\omega = \omega_x dy \wedge dz + \omega_y dz \wedge dx + \omega_z dx \wedge dy,$$

$$X_a = a_x \partial_x + a_y \partial_y + a_z \partial_z, \quad X_b = b_x \partial_x + b_y \partial_y + b_z \partial_z.$$

↓

$$\langle \omega | X_a, X_b \rangle = \omega \cdot (a \times b)$$

$$= \omega \cdot \left(\begin{array}{c} a, b \text{ が張る平行四辺形の} \\ \text{面積ベクトル} \end{array} \right)$$

$$= \omega, a, b \text{ が張る平行六面体の体積.}$$

微分形式の積分

$\sum$ 関数値 $\times$ 微小面積 (体積) = 面積分 (体積分).

$$\begin{aligned} \int_D \omega \cdot d\mathbf{S} &= \sum_D \omega \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) \Delta u \Delta v \\ &= \sum_D \left\langle \omega \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right. \right\rangle \Delta u \Delta v. \end{aligned}$$

2 形式 ω の面積分

$$\begin{aligned} \int_D \omega &:= \int_D \left\langle \omega \left| \frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v} \right. \right\rangle du dv \\ &\left(\frac{\partial}{\partial u} = \frac{\partial q^\alpha}{\partial u} \frac{\partial}{\partial q^\alpha}, \quad \frac{\partial}{\partial v} = \frac{\partial q^\alpha}{\partial v} \frac{\partial}{\partial q^\alpha} \right). \end{aligned}$$

微分形式の積分

k 形式 ω の k 次元領域 D 上での積分

$$\int_D \omega := \int_{D_0} \left\langle \omega \left| \frac{\partial}{\partial u^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial u^k} \right. \right\rangle du^1 \cdots du^k,$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial u^i} := \frac{\partial q^\alpha}{\partial u^i} \frac{\partial}{\partial q^\alpha}, \quad i = 1, \dots, k \right).$$

ここで D は次のようにパラメータ表示されているとする。

$$D = \{ (q^\alpha(u^1, \dots, u^k))_{\alpha=1}^N \mid (u^1, \dots, u^k) \in D_0 \} \quad (D_0 \subset \mathbb{R}^k).$$

$$\frac{1}{k!} \int_D \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge dq^{\alpha_k} = \frac{1}{k!} \int_{D_0} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q(u^1, \dots, u^k)) \frac{\partial(q^{\alpha_1}, \dots, q^{\alpha_k})}{\partial(u^1, \dots, u^k)} du^1 \cdots du^k.$$

この積分の定義は D のパラメータ表示の仕方には依存しない。

微分形式の積分：Stokes の定理

Stokes の定理

ω : $k - 1$ 形式, D : k 次元領域, ∂D : D の境界 ($k \leq N$).

$$\int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega.$$

- 外微分 $d\omega$ の積分は, ω の境界上のデータで与えられる.
- 高校数学における微積分の基本定理の一般化.

$$\int_a^b \frac{df(x)}{dx} dx = f(b) - f(a).$$

微分形式の積分：Stokes の定理

$N = 3$, $(q^1, q^2, q^3) = (x, y, z)$ の場合,

ベクトル解析における Stokes の定理, Gauss の発散定理を再現する.

- Stokes の定理を再現する.

$\omega = a_x dx + a_y dy + a_z dz$: 1 形式, S : 2 次元曲面,

$$d\omega = \text{rot } \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S} = (\text{rot } \mathbf{a})_x dy \wedge dz + (\text{rot } \mathbf{a})_y dz \wedge dx + (\text{rot } \mathbf{a})_z dx \wedge dy,$$

$$\int_S \text{rot } \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r}.$$

- Gauss の発散定理を再現する.

$\omega = a_x dy \wedge dz + a_y dz \wedge dx + a_z dx \wedge dy$: 2 形式, D : 3 次元領域,

$$d\omega = \text{div } \mathbf{a} dV = (\text{div } \mathbf{a}) dx \wedge dy \wedge dz,$$

$$\int_D \text{div } \mathbf{a} dV = \int_{\partial D} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{S}.$$

微分形式の積分：Stokes の定理

【Stokes の定理の証明】

積分領域 $D \subset M$ のパラメータ付け.

$$D = \left\{ q(u^1, \dots, u^k) \mid (u^1, \dots, u^k) \in D_0 \right\} \quad (D_0 \subset \mathbb{R}^k),$$

$$f : D_0 \rightarrow D, (u^1, \dots, u^k) \mapsto (q^1(u^1, \dots, u^k), \dots, q^N(u^1, \dots, u^k)),$$

$$\omega = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_k} : D \text{ 上で定義された } k \text{ 形式.}$$

積分 $\int_D \omega$ を定義する際、 $q^\alpha = q^\alpha(u^1, \dots, u^k)$ により変数 u^α の微分形式に変換したものは、写像 $f : D_0 \rightarrow D$ による ω の引き戻し $f^* \omega$ とよばれる。

$$\begin{aligned} f^* \omega &:= \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q(u^1, \dots, u^k)) \frac{\partial q^{\alpha_1}}{\partial u^{i_1}} du^{i_1} \wedge \dots \wedge \frac{\partial q^{\alpha_k}}{\partial u^{i_k}} du^{i_k} \\ &= \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_k}(q(u^1, \dots, u^k)) \frac{\partial(q^{\alpha_1}, \dots, q^{\alpha_k})}{\partial(u^1, \dots, u^k)} du^1 \wedge \dots \wedge du^k. \end{aligned}$$

微分形式の積分は、Euclid 空間への引き戻しにより定義されている。

微分形式の積分：Stokes の定理

微分形式の引き戻しについて次の等式が基本的である：

引き戻しと外微分は交換可能

$k-1$ 形式 ω と写像 $f : D_0 (\subset \mathbb{R}^k) \rightarrow D$ (D は配位空間内の k 次元領域) について,

$$f^*(d\omega) = d(f^*\omega).$$

【証明】 $\omega = \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}(q) dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_{k-1}}$ に対し,

$$\begin{aligned} d\omega &= \frac{1}{k!} \frac{\partial \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}(q)}{\partial q^\beta} dq^\beta \wedge dq^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dq^{\alpha_{k-1}}, \\ f^*(d\omega) &= \frac{1}{k!} \frac{\partial \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}(q(u))}{\partial q^\beta} \frac{\partial q^\beta}{\partial u^j} du^j \wedge \frac{\partial q^{\alpha_1}}{\partial u^{i_1}} du^{i_1} \wedge \dots \wedge \frac{\partial q^{\alpha_{k-1}}}{\partial u^{i_{k-1}}} du^{i_{k-1}} \\ &= \frac{1}{k!} \frac{\partial \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}(q(u))}{\partial q^\beta} \frac{\partial q^\beta}{\partial u^j} \frac{\partial q^{\alpha_1}}{\partial u^{i_1}} \dots \frac{\partial q^{\alpha_{k-1}}}{\partial u^{i_{k-1}}} du^j \wedge du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_{k-1}}, \end{aligned}$$

微分形式の積分：Stokes の定理

一方, $d(f^*\omega)$ を計算すると次のようになる.

$$\begin{aligned}
 f^*\omega &= \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}(q(u)) \frac{1}{k!} \frac{\partial q^{\alpha_1}}{\partial u^{i_1}} \dots \frac{\partial q^{\alpha_{k-1}}}{\partial u^{i_{k-1}}} du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_{k-1}}, \\
 d(f^*\omega) &= \frac{1}{k!} \frac{\partial}{\partial u^j} \left[\omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}(q(u)) \frac{\partial q^{\alpha_1}}{\partial u^{i_1}} \dots \frac{\partial q^{\alpha_{k-1}}}{\partial u^{i_{k-1}}} \right] du^j \wedge du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_{k-1}} \\
 &= \frac{1}{k!} \frac{\partial \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}}{\partial u^j}(q(u)) \frac{\partial q^{\alpha_1}}{\partial u^{i_1}} \dots \frac{\partial q^{\alpha_{k-1}}}{\partial u^{i_{k-1}}} du^j \wedge du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_{k-1}} \\
 &\quad + \frac{1}{k!} \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}(q(u)) \underbrace{\frac{\partial^2 q^{\alpha_1}}{\partial u^j \partial u^{i_1}}}_{(1)} \frac{\partial q^{\alpha_2}}{\partial u^{i_2}} \dots \frac{\partial q^{\alpha_{k-1}}}{\partial u^{i_{k-1}}} \underbrace{du^j \wedge du^{i_1}}_{(2)} \wedge du^{i_2} \wedge \dots \wedge du^{i_{k-1}} \\
 &\quad + \dots \\
 &\quad ((1) \text{ は } j, i_1 \text{ について対称, } (2) \text{ は } j, i_1 \text{ について反対称だから青字部分} = 0) \\
 &= \frac{1}{k!} \frac{\partial \omega_{\alpha_1 \dots \alpha_{k-1}}}{\partial u^\beta}(q(u)) \frac{\partial q^\beta}{\partial u^j} \frac{\partial q^{\alpha_1}}{\partial u^{i_1}} \dots \frac{\partial q^{\alpha_{k-1}}}{\partial u^{i_{k-1}}} du^j \wedge du^{i_1} \wedge \dots \wedge du^{i_{k-1}} \\
 &= f^*(d\omega).
 \end{aligned}$$

(命題の証明終わり)

微分形式の積分：Stokes の定理

$$\int_{\partial D} \omega = \int_{\partial D_0} f^* \omega, \quad \int_D d\omega = \int_{D_0} f^*(d\omega) = \int_{D_0} d(f^* \omega)$$

であるから、 D が Euclid 空間 $\mathbb{R}^{k+1}$ 中の領域、座標 (q^α) が Cartesian 座標 (u^i) の場合に Stokes の定理を証明すればよい。

ここでは、 $k = 1$ の場合のみ証明する

(一般の k の場合の証明は「補遺」に記します。補遺スライドは Web に載せますので、概要欄の URL にアクセスしてご覧ください)。

証明すべき等式は、 $S_0 \subset \mathbb{R}^2$ として

$$\oint_{\partial S_0} (\omega_1 du^1 + \omega_2 du^2) = \iint_{S_0} \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial u^1} - \frac{\partial \omega_1}{\partial u^2} \right) du^1 du^2.$$

積分領域 $S_0 \subset \mathbb{R}^2$ はどのようにとってもいいから、 S_0 として右図の三角形 $P_0P_1P_2$ をとることにする。

(D として右の三角形 $P_0P_1P_2$ からなめらかに写像されるものを考えることにする)

微分形式の積分：Stokes の定理

三角形 $P_0P_1P_2$ からの写像で曲面が表せない場合.

右図のように曲面を三角形分割し、各曲面三角形上の積分に対し上の結果を適用する.

線積分について、二つの隣接する小三角形が共有する辺からの寄与は、同じ線分の逆方向の線積分が現れるので、互いにキャンセルしあい 0 となる.

$$\int_{\partial D} \omega = \sum_{\partial(\text{小三角形})} \omega,$$

$$\int_D d\omega = \sum_{\text{小三角形}} d\omega.$$

ゆえに、小三角形について Stokes の定理を証明すればよい.

微分形式の積分：Stokes の定理

$$\begin{aligned}
& \iint_{P_0 P_1 P_2} \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial u^1} - \frac{\partial \omega_1}{\partial u^2} \right) du^1 du^2 \\
&= \iint_{0 \leq u^1 + u^2 \leq 1} \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial u^1} - \frac{\partial \omega_1}{\partial u^2} \right) du^1 du^2 \\
&= \int_0^1 [\omega_2(1 - u^2, u^2) - \omega_2(0, u^2)] du^2 \\
&\quad - \int_0^1 [\omega_1(u^1, 1 - u^1) - \omega_1(u^1, 0)] du^1 \\
&= \int_{P_1 P_2} \omega_2 du^2 + \int_{P_2 P_0} \omega_2 du^2 + \int_{P_1 P_2} \omega_1 du^1 + \int_{P_0 P_1} \omega_1 du^1 \\
&= \int_{P_0 P_1 + P_1 P_2 + P_2 P_0} (\omega_1 du^1 + \omega_2 du^2) \\
&= \oint_{\partial(P_0 P_1 P_2)} (\omega_1 du^1 + \omega_2 du^2).
\end{aligned}$$

(Stokes の定理の証明終わり)

今回の内容

- ① はじめに
- ② 接ベクトル・1形式
- ③ 微分形式とくさび積
- ④ 外微分
- ⑤ 微分形式の積分
- ⑥ **まとめ**

まとめ

解析力学のための微分幾何.

- 接ベクトル
- 微分形式 (交代多重線形形式)
- くさび積 (反可換積の代数)
- 外微分
- 微分形式の積分, Stokes の定理.

次回の予定:

- Hamilton 形式の力学の幾何学的探求.